

Tractocile / 트렉토실주(아토시반아세트산염)

	<p>제품명</p> <p>트렉토실주 (아토시반아세트산염)</p>
	<p>원료약품 및 그 분량</p> <p>- 1밀리리터 중</p> <p>- 유효성분: 아토시반아세트산염(별규) 7.953 밀리그램 (아토시반으로서 7.5밀리그램)</p> <p>- 첨가제: 만니톨, 염산, 주사용증류수(용제)</p>
	<p>의약품통합정보시스템</p> <p>의약품통합정보시스템 바로가기 ></p>

효능 및 효과

다음 경우에 해당하는 임부의 조산방지

- 최소 30초간 유지되는 주기적인 자궁수축이 30분당 4회 이상의 빈도로 발생한 경우
- 1-3cm가량 경부가 확장되어 있고 (초산인 경우에는 0-3cm), 50% 이상의 소실을 보이는 경우
- 18세 이상
- 임신주수 24-33주
- 태아의 심박이 정상인 경우

용법 및 용량 : 다음과 같은 연속적인 3단계 용법으로 투여한다.

단계	용법	주사/주입 속도	아토시반 용량
1	0.9ml 정맥주사(bolus)	1분이상	6.75 mg
2	3시간 동안 부하 정맥점적주입	24 ml/hr	18 mg/hr
3	연속적인 정맥점적주입	8 ml/hr	6 mg/hr

처치시간은 48시간을 넘지 않도록 하고, 처치 기간 동안 총 용량은 330mg이 넘지 않도록 한다. 조산의 진단이

내려진 후 가능한 빨리 이 약의 투여를 시작하여야 한다. 급속정맥주사 종료 후 바로 점적 주

입을 시작하고, 이 약의 투여 후에도 자궁수축이 지속되면 다른 치료법을 고려해야 한다. 이 약의 재투여가 필요한 경우, 위의 3단계 투여를 다시 순서대로 시행한다.

[정맥 점적 주입액 조제]

점적주입용 약(5ml)은 0.9%(w/v) 염화나트륨 주사액, 젖산 링겔액, 5%(w/v) 포도당 주사액에 희석하여 사용

할 수 있다. 희석액 100ml에서 10ml를 빼내 버리고, 점적주입용 바이알(5ml) 2개로부터 이 약을 취해 넣어

0.75mg/ml 농도로 조제한 것을 24ml/hr(즉, 18mg/hr)의 속도로 3시간 동안 주입하고, 그 이후에는 주입속도

를 8ml/hr(즉, 6mg/hr)로 낮추어 준다. 다른 용량의 희석액 용기를 사용하려면 용량에 따라 상기와 같은 농도가

되도록 계산하여 조제한다.